

Espèces d'oiseaux s'étant reproduites au moins 1 fois depuis la création de la RNN du Val d'Allier (1994). Bilan au 1 octobre 2006. P.-A. Dejaifve. LPO-Auvergne et ONF.



Code de lecture : Dir. CEE : (A1) = annexe 1, (A2) = annexe 2. Sous statut : H = aussi hivernant, P = aussi migrateur.

Nom vernaculaire	Nom latin (Dir. CEE)	Nb couples nicheurs	Observations concernant la nidification (1994-2006)	Statut
<b>PODICEPIDAE</b>				
Grèbe castagneux	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	1 - 3	Stabilité. Le succès de la reproduction dépend de la quiétude des lieux, et des crues printanières.	NHP
<b>ARDEIDAE</b>				
Bihoreau gris	<i>Nycticorax nycticorax</i> (A1)	± 80	Ne nichait jusqu'en 2000 qu'aux abords de la R.N. Y a niché (2001). Comptage exhaustif en 2007.	N(H.occ.)
Crabier chevelu	<i>Ardeola ralloides</i> (A1)	0 - 1	Première nidification en 1995. 1 c. s'est reproduit, mais pas chaque année, jusqu'en 2000.	NP
Héron garde-boeufs	<i>Bubulcus ibis</i>	25	Ne nichait jusqu'en 2000 qu'aux abords de la RN. Y a niché (2001). Comptage exhaustif en 2007.	N(H.occ.)
Aigrette garzette	<i>Egretta garzetta</i> (A1)	± 25	Ne nichait jusqu'en 2000 qu'aux abords de la R.N. Y a niché (2001). Comptage exhaustif en 2007.	NP
Héron cendré	<i>Ardeola cinerea</i>	110	Fluctuations inter-annuelles (125-150 en 3 colonies, dont 2 en RN pour ± 50 c.).	NH
<b>CICONIDAE</b>				
Cigogne blanche	<i>Ciconia ciconia</i> (A1)	1 - 2	Première nidification en 1997. 1 couple jusqu'en 2003, 2 en 2004 et 2005. 1 c. en 2006.	NP
<b>ANATIDAE</b>				
Cygne tuberculé	<i>Cygnus olor</i>	5 - 10	5-6 couples nicheurs en moyenne. Le succès de la reproduction dépend des crues printanières.	NHI
Bernache du Canada	<i>Branta canadensis</i> (A2)	1 - 3	Espèce introduite. Première nidification en 2001 (1 c.), 1 c. en 2002, 2 en 2003, 3 de 2004 à 2006.	NHI
Canard colvert	<i>Anas platyrhynchos</i> (A2)	60 - 70	Le chiffre 100 c. du 1er PG était probablement trop élevé.	NHP
<b>ACCIPITRIDAE</b>				
Bondrée apivore	<i>Pernis apivorus</i> (A1)	1	Actuellement, 2 territoires. 1 couple reproducteur dans RN, mais pas chaque année.	NP
Milan noir	<i>Milvus migrans</i> (A1)	15 - 20	Pas de modification récente des effectifs; prospection "exhaustive" en 2006 (19 nids).	NP
Autour des palombes	<i>Accipiter gentilis</i>	0 - 1	2 - 3 territoires mais le nid ne se trouve qu'occasionnellement dans la R.N.	NHP
Epervier d'Europe	<i>Accipiter nisus</i>	2	5 territoires, mais seulement 2 nids, en moyenne annuelle, dans la R.N.	NHP
Buse variable	<i>Buteo buteo</i>	5 - 7	Effectif stable.	NHP
<b>FALCONIDAE</b>				

Espèces d'oiseaux s'étant reproduites au moins 1 fois depuis la création de la RNN du Val d'Allier (1994). Bilan au 1 octobre 2006. P.-A. Dejaifve. LPO-Auvergne et ONF.

Faucon crécerelle	<i>Falco tinnunculus</i>	7 - 9	Pas d'évolution d'effectif.	NHP
Faucon hobereau	<i>Falco subbuteo</i>	3	Pas de modification récemment.	NP
<b>PHASIANIDAE</b>				
Perdrix rouge	<i>Alectoris rufa (A2)</i>	10 - 12	Pas d'évolution.	NH
Caille des blés	<i>Coturnix coturnix (A2)</i>	1 - 5	Trop variable d'une année à l'autre (comme partout) pour être chiffré. (1 à 7 mâles chanteurs)	NP
Faisan de Colchide	<i>Phasianus colchicus</i>	3 - 7	Gros apport d'oiseaux d'élevage dans les 2/3 sud de la réserve, mais peu se reproduisent.	NH
<b>RALLIDAE</b>				
Râle d'eau	<i>Rallus aquaticus (A2)</i>	1 - 2		NHP
Gallinule poule-d'eau	<i>Gallinula chloropus (A2)</i>	7 - 10	Effectif stable.	NHP
Foulque macroule	<i>Fulica atra (A2)</i>	± 5	Statu quo.	NHP
<b>RECURVIROSTRIDAE</b>				
Echasse blanche	<i>Himantopus himantopus(A1)</i>	0 - 1	Première tentative de nidification en 2006. Œufs couvés puis abandonnés.	
<b>BURHINIDAE</b>				
Oedicnème criard	<i>Burhinus oedicnemus (A1)</i>	35 - 45	Espèce bien suivie mais difficile à recenser. Pas de modification récente.	NHP
<b>CHARADRIIDAE</b>				
Petit Gravelot	<i>Charadrius dubius</i>	35	Forte baisse en 10 ans, due à l'emboisement et à la qualité de certaines plages.	NP
Vanneau huppé	<i>Vanellus vanellus (A2)</i>	1 - 3	En forte baisse dans le département depuis 20 ans. 2 ou 3 couples (maxi) dans la RN.	NHP
<b>SCOLOPACIDAE</b>				
Courlis cendré	<i>Numenius arquata (A2)</i>	2 - 4	Espèce mal prospectée. 2 à 4 couples ? Forte incertitude. Probablement pas chaque année.	NHP
Chevalier guignette	<i>Actitis hypoleucos</i>	≤ 5	Espèce bien suivie. Effectif stable. Nid très difficile à trouver.	NHP
<b>LARIDAE</b>				
Goéland leucopnée	<i>Larus cachinnans</i>	1 - 2	Première nidification en 2001. Depuis, 1 ou 2 c. chaque année.	NHP
<b>STERNIDAE</b>				
Sterne pierregarin	<i>Sterna hirundo (A1)</i>	30 - 50	Effectif fort variable d'une année à l'autre. En baisse dans la R.N., en hausse ailleurs.	NP
Sterne naine	<i>Sterna albifrons (A1)</i>	20 - 40	Idem. Le succès de la reproduction des sternes dépend des crues et du niveau d'étiage.	NP
<b>COLUMBIDAE</b>				

Espèces d'oiseaux s'étant reproduites au moins 1 fois depuis la création de la RNN du Val d'Allier (1994). Bilan au 1 octobre 2006. P.-A. Dejaifve. LPO-Auvergne et ONF.

Pigeon colombin	<i>Columba oenas</i> (A2)	± 5	Effectif surestimé lors du 1er plan de gestion.	NHP
Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i> (A2)	≤ 75	Pas de modification sensible récemment, mais ne dépasse certainement pas 100 c. du 1er PG.	NHP
Tourterelle turque	<i>Streptopelia decaocto</i> (A2)	2 - 3	2 ou 3 nids dont l'emplacement change souvent.	NH
Tourterelle des bois	<i>Streptopelia turtur</i> (A2)	≥ 100	Espèce très difficile à recenser vu ses mœurs.	NP
<b>CUCULIDAE</b>				
Coucou gris	<i>Cuculus canorus</i>	> 20 ?	Sans modification.	NP
<b>STRYGIDAE</b>				
Chevêche d'Athéna	<i>Athene noctua</i>	0 - 1	Seule preuve récente de nidification dans la RN : 8/07/06 (1 jeune à terre, Châtel)	NH
Chouette hulotte	<i>Strix aluco</i>	2 - 4	Pas de changement récent. 4 (?) nicheurs + quelques territoires.	NH
Hibou moyen-duc	<i>Asio otus</i>	3	Pas signalé nicheur dans le 1er plan de gestion (voir cependant Pic 1983). 3 nids depuis 2004.	NHP
<b>ALCEDINIDAE</b>				
Martin-pêcheur d'Europe	<i>Alcedo atthis</i> (A1)	4 - 8	Effectif remarquablement stable jusqu'en 2005. Après l'hiver 2004-2005: 4 c. En 2006: 6 c.	NH
<b>MEROPIDAE</b>				
Guêpier d'Europe	<i>Merops apiaster</i>	30 - 40	L'effectif a doublé depuis 1998.	NP
<b>UPUPIDAE</b>				
Huppe fasciée	<i>Upupa epops</i>	0 - 1	Niche très rarement dans les limites de la R.N. Forte diminution aux abords de la RN.	NP
<b>PICIDAE</b>				
Torcol fourmilier	<i>Jynx torquilla</i>	± 5	En diminution probable.	NP
Pic vert	<i>Picus viridis</i>	30 ?	Estimation inchangée.	NH
Pic épeiche	<i>Dendrocopos major</i>	30 ?	Effectif sans évolution apparente.	NH
Pic épeichette	<i>Dendrocopos minor</i>	5 - 10 ?	Estimation inchangée.	NH
<b>ALAUDIDAE</b>				
Alouette lulu	<i>Lullula arborea</i> (A1)	± 60		NHP
Alouette des champs	<i>Alauda arvensis</i> (A2)	≥ 20	N'a pas fait l'objet de recensement exhaustif.	NHP
<b>HIRUNDINIDAE</b>				
Hirondelle de rivage	<i>Riparia riparia</i>	300 - 1400	Effectifs nicheurs très variables d'une année à l'autre.	NP
Hirondelle de fenêtre	<i>Delichon urbica</i>	± 120	En très nette augmentation. Seule colonie : sous le pont de Châtel, depuis 2000.	NP

Espèces d'oiseaux s'étant reproduites au moins 1 fois depuis la création de la RNN du Val d'Allier (1994). Bilan au 1 octobre 2006. P.-A. Dejaifve. LPO-Auvergne et ONF.

<b>MOTACILLIDAE</b>				
Pipit des arbres	<i>Anthus trivialis</i>	?	Effectifs toujours faibles mais très variables d'une année à l'autre.	NP
Bergeronnette printanière	<i>Motacilla flava flava</i>	± 5	Effectif antérieur surestimé car elle niche souvent en bordure extérieure de la R.N. (6c.)	NP
Bergeronnette grise	<i>Motacilla alba</i>	± 30	En diminution suite à la colonisation des plages par des peupliers (moy. 95-06: 29 c.).	NHP
<b>TROGLODYTIDAE</b>				
Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>	> 100	Non recensé. Effectif considéré comme inchangé, mais les 200 c. du 1er PG étaient trop élevés.	NH
<b>PRUNELLIDAE</b>				
Accenteur mouchet	<i>Prunella modularis</i>	10 (20 ?)	Non recensé. Effectif considéré comme inchangé.	NHP
<b>TURDIDAE</b>				
Rougegorge familier	<i>Erithacus rubecula</i>	?	Non recensé. Effectif considéré comme inchangé.	NHP
Rosignol philomèle	<i>Luscinia megarhynchos</i>	≥ 200 ?	Pas de modification récente des effectifs.	NHP
Rougequeue noir	<i>Phoenicurus ochruros</i>	3	Varie de 1 à 3 c., selon les années.	NHP
Rougequeue à front blanc	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	0 - 3	Plusieurs sur les terrasses bordant la R.N. Nicheur exceptionnel à l'intérieur de la R.N.	NP
Tarier des prés	<i>Saxicola rubetra</i>	0 - 1	Nidification confirmée, mais pas chaque année. Un seul site (La Ferté) ; un seul couple par an.	NP
Tarier pâtre	<i>Saxicola torquata</i>	20 - 30		NP(H:oc.)
Traquet motteux	<i>Oenanthe oenanthe</i>	0 - 1	1 mâle cantonné (Lys, 1994). 1 couple cantonné (Bessay, 1995). Plus de nidification depuis.	NP
Merle noir	<i>Turdus merula</i> (A2)	≤ 150 ?	Sans modification (200 c. du 1er PG était trop élevé).	NHP
Grive musicienne	<i>Turdus philomelos</i> (A2)	≥ 50	Estimation à prendre sous réserve.	NHP
Grive draine	<i>Turdus viscivorus</i> (A2)	20 ?	Inchangé.	NHP
<b>SYLVIDAE</b>				
Bouscarle de Cetti	<i>Cettia cetti</i>	0 - 1	Disparition en 1998. Dernier couple nicheur du département. Revu en 05/2000, sans suite.	NHP
Cisticole des joncs	<i>Cisticola juncidis</i>	0 - 1	Apparition en 1974. Reproductions jusqu'en 1996 et 1997. Dernier couple du département.	NHP
Locustelle tachetée	<i>Locustella naevia</i>	≤ 15	Difficile à dénombrer avec exactitude car les mâles chantent en halte migratoire.	NP
Rousserolle effarvate	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	≤ 20	En augmentation suite à l'installation de jeunes ripisylves.	NP
Hypolaïs polyglotte	<i>Hippolais polyglotta</i>	20 - 30	Estimation antérieure erronée, les autres oiseaux étant sur les abords.	NP
Fauvette babillarde	<i>Sylvia curruca</i>	15 - 20	Estimation plus précise.	NP
Fauvette grisette	<i>Sylvia communis</i>	± 50	La nouvelle estimation, plus précise, se situe dans le bas de la fourchette du 1er PG.	NP
Fauvette des jardins	<i>Sylvia borin</i>	30 - 40		NP
Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i>	≥ 100	Avait, peut-être, été surestimé.	NHP
Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i>	≥ 200 ?		NHP
Pouillot fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>	?		NP

Espèces d'oiseaux s'étant reproduites au moins 1 fois depuis la création de la RNN du Val d'Allier (1994). Bilan au 1 octobre 2006. P.-A. Dejaifve. LPO-Auvergne et ONF.

Roitelet triple-bandeau	<i>Regulus ignicapillus</i>	?		NHP
<b>MUSCICAPIDAE</b>				
Gobemouche gris	<i>Muscicapa striata</i>	< 10	Sans évolution.	NP
<b>AEGITHALIDAE</b>				
Mésange à longue queue	<i>Aegithalos caudatus</i>	± 50	Sans changement.	NHP
<b>PARIDAE</b>				
Mésange nonnette	<i>Parus palustris</i>	?	Pas d'estimation possible avec les données actuelles.	NH
Mésange boréale	<i>Parus montanus</i>	?	Même remarque que pour l'espèce précédente.	NH
Mésange bleue	<i>Parus caeruleus</i>	± 50 ?	Sans évolution.	NH
Mésange charbonnière	<i>Parus major</i>	± 50 ?	Sans évolution.	NH
<b>SITTIDAE</b>				
Sittelle torchepot	<i>Sitta europaea</i>	± 10	L'estimation du 1er PG incluait des individus nichant sur les marges de la R.N.	NH
<b>CERTIIDAE</b>				
Grimpereau des jardins	<i>Certhia brachydactyla</i>	± 50	Nouvelle estimation prudente.	NH
<b>ORIOOLIDAE</b>				
Loriot d'Europe	<i>Oriolus oriolus</i>	50 - 100 ?	Pas d'évolution sensible.	NP
<b>LANIIDAE</b>				
Pie-grièche écorcheur	<i>Lanius collurio (A1)</i>	30 - 50	Au moins 20 couples chaque année (non exhaustif). Fluctuations inter-annuelles importantes.	NP
Pie-grièche grise	<i>Lanius excubitor</i>	0 - 1	1 nidif. avant 1967. Puis en 2003 (1 c. avec 3 jeunes). Echec en 2004. Pas d'obs. en 2005-2006.	NHP
Pie-grièche à tête rousse	<i>Lanius senator</i>	0 - 1	Pas connue nicheuse dans RN, avant 1994. Tentatives de nidification en 1994 et 1999 à Lys.	NP
<b>CORVIDAE</b>				
Geai des chênes	<i>Garrulus glandarius (A2)</i>	≥ 30 ?	Parmi 50 couples du 1er PG, un bon tiers possède un nid sur les terrasses.	NHP
Pie bavarde	<i>Pica pica (A2)</i>	± 10	Une dizaine de couples dans la R.N. + nombreux territoires	NHP
Choucas des tours	<i>Corvus monedula</i>	< 5		NHP
Corneille noire	<i>Corvus corone (A2)</i>	?	Pas de recensement précis de cette espèce commune.	NHP
<b>STURNIDAE</b>				

Espèces d'oiseaux s'étant reproduites au moins 1 fois depuis la création de la RNN du Val d'Allier (1994). Bilan au 1 octobre 2006. P.-A. Dejaifve. LPO-Auvergne et ONF.

Etourneau sansonnet	<i>Sturnus vulgaris</i> (A2)	20 - 30 ?		NHP
<b>PLOCEIDAE</b>				
Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>	± 5	Dans nids d'Hirondelles de fenêtre.	NH
Moineau friquet	<i>Passer montanus</i>	5 - 7		NH
<b>FRINGILLIDAE</b>				
Pinson des arbres	<i>Fringilla coelebs</i>	≥ 75 ?	Effectif difficile à estimer sans étude spécifique. 100 du 1er PG était peut-être un peu exagéré.	NHP
Serin cini	<i>Serinus serinus</i>	5 - 7		En diminution, semble-t-il.
Verdier d'Europe	<i>Carduelis chloris</i>	?	Données insuffisantes pour autoriser une estimation digne de foi.	NHP
Chardonneret élégant	<i>Carduelis carduelis</i>	± 20	Espèce très difficile à recenser. Peut-être seulement 6 - 8 c. La quasi-totalité des nicheurs locaux occupe les bordures "boisées" de la R.N.	NHP
Linotte mélodieuse	<i>Carduelis cannabina</i>	10 - 12 ?		NHP
Bouvreuil pivoine	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	4 - 8		NHP
<b>EMBERIZIDAE</b>				
Bruant jaune	<i>Emberiza citrinella</i>	< 5	Très rare, même dans les pacages. A l'unité.	NHP
Bruant zizi	<i>Emberiza cirrus</i>	< 5		NP
Bruant des roseaux	<i>Emberiza schoeniclus</i>	< 10		NHP
Bruant proyer	<i>Miliaria calandra</i>	≥ 20		NHP