

Liste des Papillons diurnes. Synthèse. 2009

Demerges D. (LPO, 1996 et inédit) et notes de Blanchon R. (LPO),
Meyer M. & Gerend R 1992, Dejaifve P.A. (LPO).

(Codes : Nbre de stations = en 2 classes pour les obs. de D. Demerges, en 3 classes pour celles de R. Blanchon.
"Milieu fréquenté" : Lh = lande herbacée ; La = lande arbustive ; R = ripisylve ; Mh = milieu humide)

	Nom français	Fréquence	Nbre de stations	Milieu fréquenté	Observateurs
<i>HESPERIDAE</i>					
<i>Thymelicus lineolus</i> Oschenh. 1808	Hespérie du dactyle	Fréquent	5	Lh	DD
<i>Thymelicus sylvestris</i> Poda, 1761	Bande noire	Très fréquent	5	Lh	DD
<i>Thymelicus acteon</i> (Rottemburg, 1775)	Actéon	Fréquent	-5	Lh	DD
<i>Ochlodes venatus</i> Bremer & Grey, 1857	Sylvaine	Fréquent	5	La - R	DD,PAD
<i>Erynnis tages</i> L., 1758	Point de Hongrie	Très fréquent	5	Lh	DD
<i>Carcharodus alceae</i> Esper, 1780	Grisette	Peu fréquent	-5	Lh	DD
<i>Pyrgus malvae</i> L., 1758	Hespérie de la mauve	Fréquent	5	Lh - La	DD
<i>Papilio machaon</i> L., 1758	Machaon	Peu fréquent	5	Lh - Lm	DD,PAD
<i>Iphiclides podalirius</i> L., 1758	Flambé	Peu fréquent	-5	Lh - Lm	DD,PAD
<i>Leptidea sinapis</i> L., 1758	Piéride de la moutarde	Peu fréquent	-5	Lh - La	DD
<i>Colias hyale</i> L., 1758	Soufré	Fréquent			DD
<i>Colias crocea</i> Fourcroy, 1785	Souci	Fréquent	-5	Lm - Lh	DD

	Nom français	Fréquence	Nbre de stations	Milieu fréquenté	Observateurs
<i>Gonepteryx rhamni</i> L., 1758	Citron	Très fréquent	5	Lh - Lm	DD,PAD
<i>Aporia crataegi</i> L., 1758	Gazé	Très fréquent	5	Partout	DD,PAD
<i>Pieris brassicae</i> L., 1758	Piéride du chou	Fréquent	-5	Lh - La	DD,PAD
<i>Pieris rapae</i> L., 1758	Piéride de la rave	Très fréquent	5	Lh - La	DD,PAD
<i>Pieris napi</i> L., 1758	Piéride du navet	Très fréquent	5	Lh - La	DD,MM&GR
<i>Anthocaris cardamines</i> L., 1758	Aurore	Très fréquent	5	Lh - La	DD,MM&GR
<i>Euchloe crameri</i> Butler, 1869	Piéride des biscutelles	Très fréquent	5	La - R	DD,MM&GR
<i>Apatura ilia</i> Denis & Schiffermuller, 1775	Petit Mars changeant	?			MM&GR
<i>Apatura iris</i> L., 1758	Grand Mars changeant	Peu fréquent	-5	R - Mh	DD,PAD
<i>Argynnis aglaja</i> L., 1758	Grand Nacré	Peu fréquent	-5	R - Mh	DD
<i>Argynnis adipe</i> Denis & Schiffermuller, 1775	Moyen Nacré	Peu fréquent	5	La	RB
<i>Limenitis camilla</i> L., 1758	Petit Sylvain	Très fréquent	5	R - Lh	DD
<i>Nymphalis polychloros</i> L., 1758	Grande Tortue	Très fréquent	5	R - Lh	DD,PAD
<i>Nymphalis antiopa</i> L., 1758	Morio	Peu fréquent	-5	Lh - R	DD,MM&GR,PAD
<i>Inachis io</i> L., 1758	Paon-du-jour	Peu fréquent	-5	Lh - R	DD,PAD
<i>Vanessa atalanta</i> L., 1758	Vulcain	Très fréquent	5	Lh - La	DD,MM&GR,PAD
<i>Vanessa cardui</i> L., 1758	Belle-Dame	Très fréquent	5	R - La - Lh	DD,PAD
<i>Aglais urticae</i> L., 1758	Petite Tortue	Très fréquent	5	Lh - Lm	DD,PAD
<i>Polygonia c-album</i> L., 1758	Robert-le-diable	Fréquent	5	Partout	DD,PAD

	Nom français	Fréquence	Nbre de stations	Milieu fréquenté	Observateurs
<i>Araschnia levana</i> L., 1758	Carte de géographie	Très fréquent	5	La - Lh-R	DD,MM&GR
<i>Argynnis paphia</i> L., 1758	Tabac d'Espagne	Fréquent	5	Lh - La	DD,PAD
<i>Issoria lathonia</i> L., 1758	Petit Nacré	Peu fréquent	-5	La - R	DD
<i>Brenthis daphne</i> Denis & Schiffer., 1775	Nacré de la ronce	Très fréquent	5	La - Lh	DD
<i>Clossiana dia</i> L., 1758	Petite Violette	Très fréquent	-5	La	DD
<i>Melitaea cinxia</i> L., 1758	Mélitée du plantain	Fréquent	5	Lh - Lm	DD,PAD
<i>Aphantopus hyperantus</i> L., 1758	Tristan	Très fréquent	5	Lh	DD
<i>Melanargia galathea</i> L., 1758	Demi-deuil	Peu fréquent	5	La	RB,PAD
<i>Hipparchia fagi</i> Scopoli, 1763	Sylvandre	Très fréquent	5	Lh - Lm	DD
<i>Hipparchia alcyone</i> Denis & Schiffermuller, 1775	Petit Sylvandre	Peu fréquent	1/3	La	RB
<i>Hipparchia semele</i> L., 1758	Agreste	Peu fréquent	1/3	La	RB
<i>Hipparchia statilinus</i> Hufnagel, 1766	Faune	Peu fréquent	-5	La	RB
<i>Minois dryas</i> Scopoli, 1763	Grand Nègre des bois	Peu fréquent	-5	Lh	DD
<i>Brintesia circe</i> Fabricius, 1775	Silène	Peu fréquent	-5	Lh	DD
<i>Maniola jurtina</i> L., 1758	Myrtil	Peu fréquent	-5	Lh-Mh	DD,PAD
<i>Pyronia tithonus</i> L., 1771	Amaryllis	Très fréquent	5	Partout	DD,PAD
<i>Coenonympha pamphilus</i> L., 1758	Fadet commun	Très fréquent	5	Lh - La	DD
<i>Pararge aegeria</i> L., 1758	Tircis	Très fréquent	5	Lh	DD
<i>Lasiommata megera</i> L., 1758	Mégère (fem.), Satyre (mâle)	Peu fréquent	-5	R - La	DD

	Nom français	Fréquence	Nbre de stations	Milieu fréquenté	Observateurs
<i>LYCAENIDAE</i>					
<i>Lycaena phlaeas</i> L., 1761	Cuivré commun	Très fréquent			DD,MM&GR
<i>Thersamolycaena dispar</i> Haworth, 1803	Cuivré des marais	Très fréquent	5	La - Lh	DD,MM&GR,PAD
<i>Heodes tityrus</i> Poda, 1761	Argus myope	Fréquent	-5	Lh - Lh	DD
<i>Celastrina argiolus</i> L., 1761	Azuré des nerpruns	Fréquent	-5	Lh	DD
<i>Aricia agestis</i> Denis & Schiffermuller, 1775	Collier-de-coraïl	Peu fréquent	5	La - Lh	DD,MM&GR
<i>Cyaniris semiargus</i> Rottemburg, 1775	Demi-Argus	Fréquent	5	Lh	DD
<i>Polymmatius icarus</i> Rottemburg, 1775	Argus bleu	Fréquent	5	Lh - Lm	DD